

Afatinib 妥復克錠

一、作用機轉：標靶藥物。會與表皮生長因子受體結合，進而抑制腫瘤生長。

二、致吐性：輕度致吐(低於10%的病人會發生嘔吐)

三、注意事項及常見或嚴重副作用：

(一) 皮膚方面副作用：痤瘡(90%)、皮疹(90%)、甲溝炎(58%)、皮膚乾燥(31%)、皮膚搔癢(21%)、唇炎(12%)、手足症候群(7%)。皮膚方面的副作用，醫師會視情況給予治療，大多可達到良好的控制。

(二) 代謝及內分泌方面副作用：體重減輕(17%)、低血鉀(11%)

(三) 胃腸方面副作用：腹瀉(96%)為常見的副作用，多發生於給藥的前6個星期。口腔黏膜破損(71%)、食慾減退(29%)、嘔吐(<5%)

(四) 肝臟方面副作用：肝功能指數升高(8-11%)。停藥後可恢復，可能需降低劑量。

(五) 眼睛方面副作用：結膜炎(11%)、角膜炎(<1%)

(六) 腎臟方面副作用：膀胱炎(13%)、腎功能指數升高(6%)

(七) 呼吸方面副作用：鼻出血(17%)、流鼻涕(11%)、肺炎(>1%，亞洲人：2%)、間質性肺炎(1.3-1.5%)

(八) 其它方面副作用：發燒(12%)、疲倦(<2%)

藥師小叮嚀：

1. 一天一次，請固定時間空腹服用(飯前一小時或飯後三小時)。
2. 無法吞服之病人，可將錠劑放入約 100ml 飲用水(不可置於碳酸飲料或其它液體)，攪拌直到崩散成小顆粒後(約 15 分鐘)立即飲用。再以 100ml 水潤洗杯子後飲下。
3. 痤瘡型皮疹的副作用自我照護請參照「副作用症狀解釋與自我照護」中《痤瘡型皮疹》的章節。
4. 腹瀉時請按照醫師指示服用止瀉藥如 Loperamide，直至腹瀉情形停止滿 12 小時。請參照「副作用症狀解釋與自我照護」中《腹瀉》的章節。
5. 間質性肺炎的症狀為持續的咳嗽，呼吸困難及輕微的發燒，若有此情形請盡速就醫。

註釋：抗癌藥物進行臨床試驗時，所收載的副作用，包括藥物本身的副作用、原本疾病表現的症狀、或當下併用的其他藥物的可能副作用。

本資訊僅供參考，若有疑問，請諮詢癌症專業藥師或腫瘤科醫師。