

Cytarabine 賽德薩注射劑

- 一、作用機轉：細胞毒性藥物。可鑲嵌到細胞的DNA 上，抑制DNA 的合成，造成細胞死亡。
- 二、致吐性：低度致吐 (有10%-30%的病人會發生嘔吐)，高劑量屬中度致吐 (有30%- 90%的病人會發生嘔吐)
- 三、骨髓抑制程度：中度至高度抑制。依給藥的劑量或輸注的速度。白血球減少(>10%)、血小板減少(>10%)、貧血(>10%)。
- 四、注意事項及常見或嚴重副作用：
 - (一) 因免疫力降低，可能增加感染的危險。
 - (二) 通常白血球會在給藥後降低，如果有任何感染的症狀如發燒，打顫，咳嗽，喉嚨痛等，請盡速就醫。也會造成血小板減少及貧血的現象，要注意身上是否有小紫斑，或小出血點。可能會較容易感到疲勞。
 - (三) 心臟血管方面副作用：心包炎(<0.1%)、心肌病變。
 - (四) 皮膚方面副作用：掉髮(全掉)、皮疹(>10%)。
 - (五) 代謝及內分泌方面副作用：使用高劑量時可能造成高尿酸血症(1-10%)、電解質不平衡 (血鉀、血鈣降低)。
 - (六) 胃腸方面副作用：噁心(>10%)、嘔吐(>10%)、厭食(>10%)、口腔黏膜破損(>10%)、腹痛、腹瀉(1-10%)。
 - (七) 肝臟方面副作用：肝功能指數升高(>10%)。
 - (八) 骨骼肌肉方面副作用：使用高劑量時可能造成橫紋肌溶解。
 - (九) 神經方面副作用：使用高劑量時可能影響小腦功能(5-50%)，其症狀有運動失調、眼球震顫...等。大部分都是可恢復的。可能的危險因子：年齡(>49歲)、累積劑量、性別、之前有中樞神經系統疾病及腎功能不佳者。
 - (十) 眼睛方面副作用：使用高劑量時，可能發生結膜炎。可使用類固醇的眼藥水來預防及減少此副作用。
 - (十一) 呼吸系統副作用：急性呼吸窘迫症候群、肺水腫、肺炎(1-10%)。

註釋： 抗癌藥物進行臨床試驗時，所收載的副作用，包括藥物本身的副作用、原本疾病表現的症狀、或當下併用的其他藥物的可能副作用。

藥物副作用的定義是由美國癌症研究院制訂的 Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE, 又稱常見毒性標準), 用於描述病人接受化療後，所發生器官毒性的嚴重度分級。毒性分級由器官系統的特別分類，分為輕微 (1 級)、中級 (2 級)、嚴重(3 級), 或致命(4 級)、死亡 (5 級)。當你發生 3 級以上的副作用時，應盡速就醫。