

## Eribulin (Halaven)：賀樂維

- 一、作用機轉:藥物作用於細胞骨架，造成細胞骨架無法順利作用，進而使癌細胞分裂受到抑制甚至死亡。
- 二、致吐性: 18 % (低致吐性)。
- 三、骨髓抑制程度:嗜中性球減少(82 %；3/4 級 28-29 %)、Anemia(58 %；3/4 級 2 %)。
- 四、注意事項及常見或嚴重副作用:
  - (一) 心血管方面副作用: 周邊水腫(5-10 %)、心電圖異常(<1 %)。
  - (二) 血液方面副作用: 嗜中性球減少(82 %；3/4 級 28-29 %)、具有發燒的中性球減少(5 %)、Anemia(58 %；3/4 級 2 %)、血小板減少(1 %)。
  - (三) 消化系統副作用:噁心(35 %)、便秘(25 %)、嘔吐(18 %)、腹瀉(18 %)、食慾降低(20 %)、黏膜發炎(9 %)、腹痛(5-10 %)、味覺異常(5-10 %)、消化不良(5-10 %)、嘴巴發炎(5-10 %)、口乾(5-10 %)。
  - (四) 中樞神經副作用:疲勞(10-54 %)、周邊神經痛(35 %；3/4 級≤8%)、頭痛(19 %)、憂鬱(5-10 %)、頭暈(5-10 %)、失眠(5-10 %)、肌肉無力(5-10 %)，當有感受到手腳有麻木、刺痛、燒灼感請告知您的醫師。
  - (五) 神經、骨骼肌肉副作用:無力(10-54 %)、關節痛(10-22 %)、背部疼痛(16 %)、骨痛(12 %)、四肢疼痛(11 %)、肌肉痙攣(5-10 %)。
  - (六) 肝臟副作用:ALT 上升(18 %)。停藥可恢復。
  - (七) 皮膚副作用:落髮(45 %)、起疹子(5-10 %)。
  - (八) 眼睛副作用:流淚(5-10 %)。
  - (九) 內分泌及代謝副作用:體重流失(21 %)，低血鉀(5-10 %)。
  - (十) 呼吸系統副作用:呼吸困難(16 %)、咳嗽(14 %)、上呼吸道感染(5-10 %)。
  - (十一) 泌尿道副作用:尿道感染(10 %)。
  - (十二) 發燒(21 %)。

### 藥師小叮嚀:

1. 在服藥的期間若有出現:發燒、打顫、咳嗽、喉嚨痛等症狀，請盡速就醫。
2. 若在服藥後有出現或加重周邊神經病變的情形，請告知醫師(如:手腳出現麻木、刺痛、燒灼感)。

**註釋:** 抗癌藥物進行臨床試驗時，所收載的副作用，包括藥物本身的副作用、原本疾病表現的症狀、或當下併用的其他藥物的可能副作用。

藥物副作用的定義是由美國癌症研究院制訂的 Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE, 又稱常見毒性標準)，用於描述病人接受化療後，所發生器官毒性的嚴重度分級。毒性分級由器官系統的特別分類，分為輕微 (1 級)、中級 (2 級)、嚴重(3 級)，或致命 (4 級)、死亡 (5 級)。當你發生 3 級以上的副作用時，應盡速就醫。