

Crizotinib 截剋瘤膠囊

- 一、作用機轉: Crizotinib 為一酪胺酸激酶抑制劑，其可抑制異常的 ALK 酪胺酸酶，干擾 ALK 酪胺酸酶的訊息傳遞，當 ALK 酪胺酸酶的傳訊受阻後，抑制癌細胞的增生，進一步達到抗腫瘤的效果。
- 二、致吐性: 中度致吐 (約有 51-55 % 的病人服藥後會發生嘔吐)。
- 三、骨髓抑制程度: 淋巴球減少(51 % ; 3/4 級 9-11 %) ; 嗜中性減少(49 % , 3/4 級:5-12 %)。
- 四、注意事項及常見或嚴重副作用:
 - (一) 心血管方面副作用: 心電圖異常(<2 %)、心跳緩慢(低於 60 次/分鐘)(4-11 %)的情況。建議在家中量血壓時也要注意心跳數值，若有心跳低於 50 次/分鐘請告知醫師。
 - (二) 消化系統副作用: 噁心(51-55 %)、嘔吐(40-47 %)、腹瀉(43-60 %)、便秘(27-42 %)、食慾降低(19-27 %)。
 - (三) 周邊神經副作用: 周邊神經病變(13-19 % , 可能表現有感覺異常、神經疼痛、肌肉無力等 ; 3/4 級 <1%)。
 - (四) 肝臟副作用: ALT/AST(肝指數)上升(13-14 % ; 3/4 級 5-17%)通常發生在開始用藥的兩個月內，當發現自己有出現黃疸情況(皮膚、眼白變黃、深核色尿液等情況)，也請告知醫師。
 - (五) 視覺改變(59-62 %):服用 Crizotinib 可能會造成視力模糊、畏光、複視、飛蚊症的情況。因此在開車或操作高危險性的機具必須更加注意。好發時間多於開始服藥後的一周內，通常這樣的視覺改變會隨著藥物使用的時間逐漸改善。
 - (六) 肺毒性: 普遍出現在開始用藥後的兩個月內(肺炎:4 %、間質性肺病: 3 %、呼吸困難: 2 %)，若有出現呼吸狀況比過去要差的情況或異常，請立即告知醫師。

小叮嚀:

1. 藥品服用時要整粒吞服，不可以磨碎、或打開膠囊。
2. 如果忘記服藥，在下次服藥的時間的前六小時以內想起，不需要補吃，但若是前六小時以外的時間想起，必須補服藥品。
3. 葡萄柚水果(或果汁)會抑制 Crizotinib 的代謝，請勿在服藥期間使用葡萄柚。
4. 在服藥的期間若有出現:發燒、打顫、咳嗽、喉嚨痛等症狀，請盡速就醫。
5. 由於藥物會對人體產生光敏感性，外出時請做好防曬工作，可以降低光線對皮膚的刺激性。

註釋: 抗癌藥物進行臨床試驗時，所收載的副作用，包括藥物本身的副作用、原本疾病表現的症狀、或當下併用的其他藥物的可能副作用。

藥物副作用的定義是由美國癌症研究院制訂的 Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE, 又稱常見毒性標準), 用於描述病人接受化療後，所發生器官毒性的嚴重度分級。毒性分級由器官系統的特別分類，分為輕微 (1 級)、中級 (2 級)、嚴重 (3 級), 或致命 (4 級)、死亡 (5 級)。當你發生 3 級以上的副作用時，應盡速就醫。